

Dott. Martino Martellotta

Specialista in Chirurgia dell'apparato digerente
ed endoscopia digestiva chirurgica

presso



VISITE SPECIALISTICHE • HEALTH • INDAGINI RADIOLOGICHE
74015 Martina Franca (TA) - Via Leone XIII, n°43/C, tel. 0809907711
gmdiagnostics@gmail.com - www.gmdiagnostics.it

GASTROSCOPIA


CONSIGLI PRELIMINARI

IL GIORNO DELL'ESAME:

- presentarsi a DIGIUNO.
- È consentito assumere liquidi chiari fino a 2 ore precedenti l'esame.
- La **terapia domiciliare abituale** va assunta regolarmente con poca acqua almeno 2 ore prima dell'esame.
- È necessaria la **presenza di un accompagnatore** in quanto l'esame verrà eseguito in sedazione superficiale (o profonda), oltre a farmaci che rendono l'esame più confortevole e meno doloroso. Per tale motivo è **rigorosamente vietato guidare** nelle 24 ore successive all'esame. Si consiglia, pertanto, di recarsi nel centro di endoscopia accompagnati o utilizzando i mezzi di trasporto pubblici.
- Per l'esecuzione dell'esame è necessario **non indossare o rimuovere prima** di entrare in sala endoscopica **oggetti in metallo e di valore** (anelli, braccialetti, orecchini, collane e piercing).
- Se portatore di **pacemaker o defibrillatore cardiaco**, è necessario **segnalarlo** prima di accedere in sala endoscopica.
- Portare con sé eventuali **cartelle cliniche e/o referti precedenti** (endoscopici, radiologici, ecografici, etc.).
- È **consigliata una preliminare visita cardiologica con ECG**, soprattutto in quei pazienti che abbiano sofferto o soffrano di patologie cardiologiche e/o respiratorie.
- È importante, prima dell'esecuzione dell'esame endoscopico, **comunicare l'eventuale esistenza di allergie**.

Come prepararsi all'EGDS?

DIETA




Per la gastroscopia non esiste una preparazione specifica, occorre semplicemente **essere a digiuno da almeno 6 ore da cibi solidi e liquidi**, ovvero

- dalla mezzanotte* della sera precedente se la procedura è programmata al mattino;
- dalle 10*, circa se la procedura è programmata al pomeriggio, dopo le 16

È consentita solamente l'assunzione di liquidi chiari non gassati e non alcolici, ovvero liquidi trasparenti (*acqua, tè, camomilla, eventualmente anche zuccherati*) fino a tre ore prima dall'esecuzione dell'esame.

Gastroscopia



*L'**ultimo pasto**, dovrà essere **molto leggero** (tè e fette biscottate o grissini).

Nel corso dell'esame il paziente viene disteso sul fianco sinistro e gli sarà posizionato tra i denti un boccaglio di plastica all'interno del quale si introduce lo strumento.

TERAPIA ANTICOAGULANTE

Poiché è possibile che la procedura richieda l'esecuzione di biopsie e/o polipectomie, l'eventuale terapia antiaggregante e/o anticoagulante in corso andrà modulata come segue, in maniera da poter eseguire nella stessa seduta il trattamento dei polipi senza necessità di riprogrammare la procedura, pertanto:

ANTICOAGULANTI CLASSICI	SOSTANZA	NOME COMMERCIALE
	Acenocumarolo	Sintrom®
	Warfarin	Coumadin®
- Il paziente deve rivolgersi al Centro di Riferimento o al Medico di Medicina Generale per la sospensione di tale terapia (che dovrà avvenire almeno 5 giorni prima dell'esame) e per la prescrizione della terapia eparinica sostitutiva. L'ultima dose di eparina potrà essere assunta al massimo 8 ore prima della procedura endoscopica. Il paziente dovrà presentarsi il giorno dell'esame munito della risposta degli esami del sangue con i valori di PT e INR ($< 1,5$), eseguiti 24 - 48 ore prima dell'esame. - La terapia "ponte" con eparina s.c. andrà valutata dal proprio medico curante, tenendo presente che, in genere, viene raccomandata in pazienti ad alto rischio tromboembolico (valvola mitralica meccanica, sostituzione valvolare cardiaca + FA, stenosi mitralica + FA, episodio di TVP entro i 3 mesi). N.B. La terapia con eparina a basso peso molecolare non va somministrata la mattina dell'esame		

ANTICOAGULANTI DI NUOVA GENERAZIONE "NOACS" O "NAO"	SOSTANZA	NOME COMMERCIALE
	Rivaroxaban	Xarelto®
	Apixaban	Eliquis®
	Dabigatran	Pradaxa®
	Edoxaban	Lixiana®
- Vanno sospesi 24/48 ore prima in base al tipo di farmaco e per esami a basso rischio di sanguinamento (EGDS o EGDS + biopsia) e comunque in accordo con il Medico di Medicina Generale. - Vanno sospesi dalle 48/G6 ore prima per gli esami operativi ad alto rischio di sanguinamento (COLONSCOPIE CON BIOPSIE, COLONSCOPIE CON POLIPECTOMIE).		

TERAPIA ANTIAGGREGANTE	SOSTANZA	NOME COMMERCIALE
la terapia non va sospesa	Acido acetilsalicilico	Aspirina®, Aspirinetta®, Cardioaspirin®, Cardirene®, Ascriptin®
	Ticlopidina	Tiklid®
la terapia va sospesa 7 giorni prima dell'esame endoscopico	Clopidorel	Plavix®
	Prasugrel	Efient®
	Ticagrelor	Brilique®

DOPPIA ANTIAGGREGAZIONE	SOSTANZA	NOME COMMERCIALE
vanno sospesi previo accordo con il Cardiologo curante.	Acido acetilsalicilico + Clopidogrel	(Duoplavin®)
	Acido acetilsalicilico + Prasugrel	
	Acido acetilsalicilico + Ticagrelor	

